

MEERKEUZE VRAGEN

B.5.6. Speciale Circulatie

1. Hoeveel afzonderlijke capillaire bedden zijn er aanwezig in een typische portale circulatie?
 - a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3
 - e) 4

2. Wat gebeurt er met de gemiddelde afstand tussen de spiercellen en het dichtstbijzijnde capillair als een skeletspier gefaseerd traint?
 - a) De afstand zal afnemen
 - b) De afstand zal toenemen
 - c) De afstand blijft hetzelfde
 - d) In perifere vezels zal de afstand toenemen
 - e) In perifere vezels zal de afstand afnemen

3. Welk type skeletspiercontractie duurt meestal langer?
 - a) Tonische samentrekkingen
 - b) Fasische contracties
 - c) Tonische en fasische contracties
 - d) Tonische en concentrische contracties
 - e) Tonische en excentrische contracties

4. Welk deel van de hartspierwand zal tijdens een normale cardiale systole het minst doorbloed zijn?
 - a) De rechter atriumwand
 - b) De linker atriumwand
 - c) De rechterventrikelwand
 - d) De linkerventrikelwand
 - e) Het ventriculaire septum

5. De huidcirculatie is erg belangrijk omdat het betrokken is bij de regulering van welke parameter?
 - a) De hoeveelheid water in het lichaam
 - b) De temperatuur in het lichaam
 - c) De pH (=zuurgraad) in het lichaam
 - d) De temperatuur buiten het lichaam
 - e) De bescherming tegen microben van buitenaf

Antwoorden:

1. c.
2. a.
3. b.
4. d.
5. b.